

製品別比較表

2025 年 4 月改訂

製品名	アマンタジン塩酸塩錠 50 mg「ツルハラ」	シンメトレル錠 50 mg
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	6.10 円／錠	8.40 円／錠
薬効分類名	抗A型インフルエンザウイルス剤／625、精神神経用剤／117、抗パーキンソン剤／116	
組成	1 錠中アマンタジン塩酸塩 50mg 含有	
性状	白～微黄白色のフィルムコーティング錠 識別記号：010 直径：約 6.5mm 厚さ：約 3.9mm 質量：約 110mg	白色のフィルムコート錠 直径：7.1mm 厚さ：3.3mm 質量：0.12g
添加物	乳糖水和物、 <u>バレイショデンプン</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>マクロゴール 6000</u> 、 <u>カルナウバロウ</u>	セルロース、ポビドン、第三リン酸カルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール
効能・効果	○ パーキンソン症候群 ○ 脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善 ○ A 型インフルエンザウイルス感染症	
用法・用量	〈パーキンソン症候群の場合〉 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として初期量 1 日 100mg を 1～2 回に分割経口投与し、1 週間後に維持量として 1 日 200mg を 2 回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減できるが、1 日 300mg 3 回分割経口投与までとする。 〈脳梗塞後遺症の場合〉 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として 1 日 100～150mg を 2～3 回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。 〈A 型インフルエンザウイルス感染症の場合〉 通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として 1 日 100mg を 1～2 回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。ただし、高齢者及び腎障害のある患者では投与量の上限を 1 日 100mg とすること。	

アマンタジン塩酸塩錠 50 mg「ツルハラ」につき、標準製剤のシンメトレル錠 50 mgを対照として、4 種試験液を用いて溶出試験を実施した結果、標準製剤のシンメトレル錠 50 mg と同等であった。

図1 水

時間 (min)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」 (%)	シンメトレル錠 50mg (%)
0	0	0
5	20	20
10	45	40
15	65	55
30	90	85
45	95	95

図2 pH1.2

時間 (min)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」 (%)	シンメトレル錠 50mg (%)
0	0	0
5	20	20
10	45	40
15	65	55
30	90	85
45	95	95

図3 pH4.0

時間 (min)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」 (%)	シンメトレル錠 50mg (%)
0	0	0
5	20	20
10	45	40
15	65	55
30	90	85
45	95	95

図4 pH6.8

時間 (min)	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」 (%)	シンメトレル錠 50mg (%)
0	0	0
30	40	35
60	65	60
90	85	80
120	90	85
180	95	90
240	95	95