

製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	アムロジピン錠 2.5m g 「ツルハラ」		ノルバスク錠 2.5m g																																																																																																										
会社名	鶴原製薬株式会社																																																																																																												
薬価	10.40 円 / 錠		13.50 円 / 錠																																																																																																										
薬効分類名	血管拡張剤 / 217																																																																																																												
組成	1 錠中アムロジピンベシル酸塩 3.47mg (アムロジピンとして 2.5mg) 含有																																																																																																												
性状	白色のフィルムコート錠 識別記号：表面 A 2.5、裏面 2.5 直径：約 6.1mm 厚さ：約 2.6mm 重量：約 89mg		白色のフィルムコート錠 直径：6.0mm 厚さ：3.0mm																																																																																																										
添加物	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、デンプン、グリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ		結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、デンプン、グリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ																																																																																																										
効能・効果	○高血圧症 ○狭心症																																																																																																												
用法・用量	・高血圧症 通常、成人にはアムロジピンとして 2.5～5mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には 1 日 1 回 10mg まで増量することができる。 - 通常、6 歳以上の小児には、アムロジピンとして 2.5mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 ・狭心症 通常、成人にはアムロジピンとして 5mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。																																																																																																												
溶出挙動の同等性(局外規による溶出試験)	アムロジピン錠 2.5m g 「ツルハラ」につき、標準製剤アムロジピン錠 5mg 「ツルハラ」を対照として、溶出試験を実施した。結果、標準製剤と同等であった。 試験液: pH1.2, 回転数: 50回転 <table><tr><th>時間(分)</th><th>対照(5mg)溶出率(%)</th><th>試験品(2.5mg)溶出率(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>10</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>30</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td>60</td><td>98</td><td>98</td></tr><tr><td>90</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> 試験液: pH3.0, 回転数: 50回転 <table><tr><th>時間(分)</th><th>対照(5mg)溶出率(%)</th><th>試験品(2.5mg)溶出率(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>10</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>30</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>60</td><td>98</td><td>98</td></tr><tr><td>90</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> 試験液: pH6.8, 回転数: 50回転 <table><tr><th>時間(分)</th><th>対照(5mg)溶出率(%)</th><th>試験品(2.5mg)溶出率(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>10</td><td>55</td><td>55</td></tr><tr><td>30</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>60</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>90</td><td>95</td><td>95</td></tr></table> 試験液: 水, 回転数: 100回転 <table><tr><th>時間(分)</th><th>対照(5mg)溶出率(%)</th><th>試験品(2.5mg)溶出率(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>10</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>30</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>60</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>90</td><td>95</td><td>95</td></tr></table> 試験液: 水, 回転数: 50回転 <table><tr><th>時間(分)</th><th>対照(5mg)溶出率(%)</th><th>試験品(2.5mg)溶出率(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>65</td><td>65</td></tr><tr><td>10</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>30</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>60</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td>90</td><td>98</td><td>98</td></tr></table>				時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)	0	0	0	5	70	70	10	85	85	30	95	95	60	98	98	90	100	100	時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)	0	0	0	5	60	60	10	75	75	30	90	90	60	98	98	90	100	100	時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)	0	0	0	5	40	40	10	55	55	30	75	75	60	85	85	90	95	95	時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)	0	0	0	5	45	45	10	60	60	30	80	80	60	90	90	90	95	95	時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)	0	0	0	5	65	65	10	80	80	30	90	90	60	95	95	90	98	98
時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)																																																																																																											
0	0	0																																																																																																											
5	70	70																																																																																																											
10	85	85																																																																																																											
30	95	95																																																																																																											
60	98	98																																																																																																											
90	100	100																																																																																																											
時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)																																																																																																											
0	0	0																																																																																																											
5	60	60																																																																																																											
10	75	75																																																																																																											
30	90	90																																																																																																											
60	98	98																																																																																																											
90	100	100																																																																																																											
時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)																																																																																																											
0	0	0																																																																																																											
5	40	40																																																																																																											
10	55	55																																																																																																											
30	75	75																																																																																																											
60	85	85																																																																																																											
90	95	95																																																																																																											
時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)																																																																																																											
0	0	0																																																																																																											
5	45	45																																																																																																											
10	60	60																																																																																																											
30	80	80																																																																																																											
60	90	90																																																																																																											
90	95	95																																																																																																											
時間(分)	対照(5mg)溶出率(%)	試験品(2.5mg)溶出率(%)																																																																																																											
0	0	0																																																																																																											
5	65	65																																																																																																											
10	80	80																																																																																																											
30	90	90																																																																																																											
60	95	95																																																																																																											
90	98	98																																																																																																											