



製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	ダイフェン配合錠	バクタ配合錠
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	15.10 円／錠	69.20 円／錠
薬効分類名	その他の化学療法剤／629	
組成	1 錠中スルファメトキサゾール 400mg およびトリメトプリム 80mg 含有	
性状	白色で割線を有する素錠 識別記号:TSU341 直径：約 11.0mm 厚さ：約 5.1mm 質量：約 500mg	白色の円形の素錠 直径：約 11.0mm 厚さ：約 5.1mm 質量：約 0.5g
添加物	ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム	カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム
効能・効果	○一般感染症 ＜適応菌種＞ スルファメトキサゾール／トリメトプリムに感性の腸球菌属、大腸菌、赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア・レットゲリ、インフルエンザ菌 ＜適応症＞ 肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 複雑性膀胱炎、腎盂腎炎 感染性腸炎、腸チフス、パラチフス ○ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制 ＜適応菌種＞ ニューモシスチス・イロペチー ＜適応症＞ ニューモシスチス肺炎、ニューモシスチス肺炎の発症抑制	
用法・用量	（一般感染症） 通常、成人には1 日量4 錠（顆粒の場合は4g）を2 回に分割し、経口投与する。ただし、年齢、症状に応じて適宜増減する。 （ニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制） （1）治療に用いる場合 通常、成人には1 日量9～12 錠（顆粒の場合は9～12g）を 3～4 回に分割し、経口投与する。通常、小児にはトリメトプリムとして1 日量15～20mg/kg を 3～4 回に分割し、経口投与する。ただし、年齢、症状に応じて適宜増減する。 （2）発症抑制に用いる場合 通常、成人には1 日1 回1～2 錠（顆粒の場合は1～2g）を連日又は週3 日経口投与する。通常、小児にはトリメトプリムとして1 日量4～8mg/kg を2 回に分割し、連日又は週3 日経口投与する。	
溶出挙動の同等性 (局外規による溶出試験)	トリメトプリム：  スルファメトキサゾール  両剤の溶出挙動は同等であった。	