

製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	セチリジン塩酸塩錠 5mg「ツルハラ」	ジルテック錠 5
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	10.40 円／1 錠	1 7 . 8 0 円／1 錠
薬効分類名	その他のアレルギー用薬／449	
組成	1 錠中セチリジン塩酸塩 5mg 含有	
性状	白色のフィルムコート錠 識別記号：E24 直径：約 6.1mm 厚さ：約 2.8mm 質量：約 84mg	白色のフィルムコート錠 直径：約 6mm 厚さ：約 3mm 質量：約 88mg
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、 <u>クロスカルメロースナトリウム</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、 <u>マクロゴール 6000</u> 、酸化チタン、 <u>ジメチルポリシロキサン</u> 、 <u>カルナウバロウ</u>	乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール 400
効能・効果	〔成人〕 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 〔小児〕 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒	
用法・用量	〈10mg錠〉 通常、成人にはセチリジン塩酸塩として1回10mgを1日1回、就寝前に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日20mgとする。 〈5mg錠〉 〔成人〕 通常、成人にはセチリジン塩酸塩として1回10mgを1日1回、就寝前に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日20mgとする。 〔小児〕 通常、7歳以上15歳未満の小児にはセチリジン塩酸塩として1回5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与する。	
生物学的同等性(血中濃度の推移)	セチリジン塩酸塩錠 5mg「ツルハラ」と標準製剤（ジルテック錠 5）をクロスオーバー法により、セチリジン塩酸塩として 10mg（2 錠）を健康成人男子に絶食時単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.8)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。 	