

製品別比較表

2025 年 4 月改定

商品名	イミダフェナシン OD 錠 0.1mg「ツルハラ」	ウリトスOD錠 0.1mg
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	17.80 円／1 錠	42.20 円／1 錠
薬効分類名	過活動膀胱治療剤/259	
組成	1 錠中イミダフェナシン 0.1mg 含有	
性状	白色の素錠（口腔内崩壊錠） 識別記号：表面TSU049、裏面0.1 直径：約7.5mm 厚さ：約4.0mm 質量：約180mg	白色素錠（口腔内崩壊錠） 直径：7.6mm 厚さ：4.1mm 質量：約180mg
添加物	D-マンニトール、クロスポビドン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>ステアリン酸カルシウム</u>	D-マンニトール、部分アルファ化デンプン、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、クロスポビドン、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム
効能・効果	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	
用法・用量	通常、成人にはイミダフェナシンとして1回0.1mgを1日2回、朝食後及び夕食後に経口投与する。効果不十分な場合は、イミダフェナシンとして1回0.2mg、1日0.4mgまで増量できる。	
生物学的同等性(血中濃度の推移)	イミダフェナシン OD 錠 0.1mg「ツルハラ」と標準製剤のウリトス OD 錠 0.1mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（イミダフェナシン 0.1mg）健康成人男子に絶食時水で服用 1）あるいは水無し 2）で、単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、$\log(0.8) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。 水で服用 水なしで服用	