




製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	ピコスルファートナトリウム錠 2.5m g 「ツルハラ」		ラキソベロン錠 2.5m g	
会社名	鶴原製薬株式会社			
薬価	6.10 円／錠		6.10 円／錠	
薬効分類名	下剤、浣腸剤／235			
組成	1 錠中ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg 含有			
性状	白色フィルムコート錠 識別記号：2.5    直径：約 5.1mm 厚さ：約 3.1mm 質量：約 53mg		白色、円形のフィルムコーティング錠で、におい及び味はない 直径：約6.1mm 厚さ：約2.8mm 質量 約82mg	
添加物	<u>乳糖水和物</u> 、 <u>結晶セルロース</u> 、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>軽質無水ケイ酸</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、 <u>マクロゴール6000</u> 、 <u>タルク</u> 、 <u>酸化チタン</u> 、 <u>ミツロウ</u>		乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、無水ケイ酸、酸化チタン、カルナウバロウ	
効能・効果	○各種便秘症 ○術後排便補助 ○造影剤（硫酸バリウム）投与後の排便促進			
用法・用量	〈各種便秘症〉 通常、成人に対して 1 日 1 回 2～3 錠（ピコスルファートナトリウム水和物として 5～7.5mg）を経口投与する。7～15 才の小児に対して、1 日 1 回 2 錠を経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 〈術後排便補助、造影剤（硫酸バリウム）投与後の排便促進〉 通常、成人に対して 1 日 1 回 2～3 錠（ピコスルファートナトリウム水和物として 5～7.5mg）を経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。			
溶出挙動の同等性(局外規による溶出試験)	ピコスルファートナトリウム錠 2.5m g 「ツルハラ」につき、標準製剤(ラキソベロン錠 2.5mg)を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した結果、ピコスルファートナトリウム錠 2.5m g 「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。 図1 水  図2 pH1.2  図3 pH4.0  図4 pH6.8 