


製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	ファモチジン錠 20m g 「ツルハラ」	ガスター錠 20 m g
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	10.40 円／錠	13.40 円／錠
薬効分類名	消化性潰瘍用剤／232	
組成	1 錠中ファモチジン 20mg 含有	
性状	白色～微黄白色のフィルムコーティング錠 識別記号:771 直径：約 7.6mm 厚さ：約 3.3mm 質量：約 160mg	白色～微黄白色糖衣錠 直径： 8.1 mm 厚さ： 4.0 mm 質量： 0.20 g
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、 <u>マクロゴール6000</u> 、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ	無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸カルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、白糖、乳酸カルシウム水和物、マクロゴール20000、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ
効能・効果	○ 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群 ○ 下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期	
用法・用量	〈胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群〉 通常成人にはファモチジンとして 1 回 20mg を 1 日 2 回（朝食後、夕食後または就寝前）経口投与する。また、1 回 40mg を 1 日 1 回（就寝前）経口投与することもできる。 なお、年齢・症状により適宜増減する。ただし、上部消化管出血の場合には通常注射剤で治療を開始し、内服可能になった後は経口投与に切りかえる。 〈下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期〉 通常成人にはファモチジンとして 1 回 10mg を 1 日 2 回（朝食後、夕食後または就寝前）経口投与する。また、1 回 20mg を 1 日 1 回（就寝前）経口投与することもできる。なお、年齢・症状により適宜増減する。	
生物学的同等性(血中濃度の推移)	健康成人男子19名に各1錠ずつ（ファモチジンとして20mg）をクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。 (mean±S. E.、n=19) 	
溶出挙動の同等性	標準製剤(ガスター錠20mg)を対照としたファモチジン錠20m g 「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。 ファモチジン錠20m g 「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。 