

製品別比較表

2025 年 4 月改訂

製品名	リボフラビン酪酸エステル錠 20mg 「ツルハラ」	ハイボン錠 20mg
販売会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	5.70 円／錠	5.90 円／錠
薬効分類名	高コレステロール血症用剤・ビタミン B ₂ 製剤／313	
組成	1 錠中リボフラビン酪酸エステル 20mg 含有	
性状	橙黄色の割線入り錠剤 識別記号：TSU861 直径：約 8.0mm 厚さ：約 3.5mm 質量：約 190mg	黄色～淡褐黄色・素錠 長径：10.5mm 短径：5.5mm 厚さ：3.5mm 重量：188mg
添加物	乳糖水和物、 <u>バレイショデンプン</u> 、 <u>結晶セルロース</u> 、 <u>カルメロースカルシウム</u> 、 <u>ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u>	ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール 6000、カルメロースカルシウム、ポビドン、乳糖水和物
効能・効果	○高コレステロール血症 ○ビタミン B ₂ 欠乏症の予防及び治療。 ○下記疾患のうち、ビタミン B ₂ の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合。 口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎 ○ビタミン B ₂ の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等）。 高コレステロール血症及びビタミン B ₂ の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合の適応に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用しないこと。	
用法・用量	リボフラビン酪酸エステルとして、通常、成人 1 日 5～20mg を 2～3 回に分割経口投与する。 高コレステロール血症には、通常、成人 1 日 60～120mg を 2～3 回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	

標準製剤との同等性

標準製剤のハイボン錠 20mg を対照としたリボフラビン酪酸エステル錠 20mg「ツルハラ」の溶出試験結果をそれぞれ示す。リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

