

製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「ツルハラ」	アルツディスポ関節注 25mg
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	600.00 円／1 シリンジ	705.00 円／1 シリンジ
薬効分類名	関節機能改善剤	
組成	1 シリンジ(2.5mL)中 日局精製ヒアルロン酸ナトリウム 25mg	
性状	無色澄明の粘稠な水性注射液 においはない pH:6.8～7.8 浸透圧比:1.0～1.2(生理食塩液に対する比)	無色澄明の粘稠な水性注射液 においはない pH:6.8～7.8 浸透圧比:1.0～1.2(生理食塩液に対する比)
添加物	塩化ナトリウム 無水リン酸一水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナトリウム	塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム 水和物、リン酸二水素ナトリウム水和物
効能・効果	○変形性膝関節症、肩関節周囲炎 ○関節リウマチにおける膝関節痛（下記(1)～(4)の基準を全て満たす場合に限る） (1) 抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節痛のある場合 (2) 全身の炎症症状が CRP 値として 10mg/dL 以下の場合 (3) 膝関節の症状が軽症から中等症の場合 (4) 膝関節の Larsen X 線分類が Grade I から GradeⅢの場合	
用法・用量	<変形性膝関節症、肩関節周囲炎> 通常、成人 1 回 1 シリンジを 1 週間ごとに連続 5 回膝関節腔内又は肩関節（肩関節腔、肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭腱腱鞘）内に投与するが、症状により投与回数を適宜増減する。 <関節リウマチにおける膝関節痛> 通常、成人 1 回 2.5mL を 1 週間毎に連続 5 回膝関節腔内に投与する。本剤は関節内に投与するので、厳重な無菌的操作のもとに行うこと。	
生物学的同等性	(1) 関節拘縮改善作用 ウサギを用いた実験で長期間固定による後足膝関節可動域の低下に対しヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「ツルハラ」及び標準製剤(アルツディスポ関節注 25mg)はともに有意な改善作用が認められた。また両製剤間において、有意な差は認められなかった。 (2) 疼痛抑制作用 ラットのブラジキニン誘発疼痛に対し、ヒアルロン酸 Na 関節注 25mg シリンジ「ツルハラ」及び標準製剤(アルツディスポ関節注 25mg)はともに有意な抑制作用を示した。また両製剤間において、有意な差は認められなかった。	